

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU

UltraTag RBC kit
technécium (^{99m}Tc), prášok na injekciu

2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE LIEKU

Každý kit sa skladá z troch neaktívnych komponentov:

A. Reakčná liekovka (10 ml) obsahuje liečivo:

Dihydrát chloridu cínatého $96 \mu\text{g}$

B. Striekačka I obsahuje liečivo:

Chlórnan sodný 0,6 mg

Striekačku je potrebné chrániť pred svetlom vzhľadom k nebezpečnému rozkladu chlórnanu svetlom!

C. Striekačka II obsahuje liečivo:

Monohydrát kyseliny citrónovej 8,7 mg

3. LIEKOVÁ FORMA

3.1. Lieková forma

Prášok a rozpúšťadlo na injekciu.

Súčasti kitu sú určené iba na značenie erytrocytov technéciom (^{99m}Tc); nie je možné priame podanie pacientovi !

Reakčná liekovka:

Sterilný lyofilizát obsahujúci chlorid cínatý, citronan sodný a glukózu. Obsah je určený k rozriedeniu pridaním 1,0 - 3,0 ml čerstvo odobratej krvi, upravenej heparínom alebo ACD roztokom (antikoagulačné prísady).

Striekačka I:

Injekčná striekačka vopred naplnená roztokom chlórnanu sodného k okamžitému použitiu.

Striekačka II:

Injekčná striekačka vopred naplnená roztokom citrónanu a glukózy k okamžitému použitiu. Obsah obidvoch striekačiek je určený na pridanie do reakčnej liekovky podľa návodu k príprave technéciom (^{99m}Tc) značených erytrocytov. Ich obsah nie je možné priamo aplikovať pacientovi !

3.2. Vlastnosti označeného produktu

Erytrocyty označené technéciom (^{99m}Tc) sú pri použití kitu UltraTag^R RBC stabilné najmenej 6 hodín. Napriek tomu je nutné aplikovať ich bezprostredne po príprave.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikácie

Jednotlivé komponenty kitu UltraTag^R RBC nie sú určené k priamemu podávaniu pacientovi. Sú určené na prípravu technéciom (^{99m}Tc) značených erytrocytov. Pacientovi je možné aplikovať len označené erytrocyty, nie jednotlivé súčasti kitu. Erytrocyty označené technéciom

(^{99m}Tc) sa používajú na zobrazenie krvného obehu vrátane priamocirkulačnej rádionuklidovej angiografie, rovnovážnej rádionuklidovej ventrikulografie, na detekciu lokalizácie krvácania do zažívacieho traktu, na vyšetrenie pečeňových lézií (hlavne na rozlíšenie medzi hemangiómami a ostatnými poruchami, ako sú hepatómy, cysty a abscesy) a na venografie pri podozrení na hlbokú žilnú trombózu.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

Pri príprave značených erytrocytov kitom UltraTag^R RBC je nutné postupovať dôsledne podľa návodu na značenie. Odporučané množstvo technecistanu (^{99m}Tc) pre pacienta s hmotnosťou 70 kg je v rozmedzí 370 až 740 MBq. Aktivita pripravená k i. v. aplikácii má byť bezprostredne pred podaním zmeraná.

4.3. Kontraindikácie.

Nie sú známe.

4.4. Špeciálne upozornenia

4 - 6 hodín po aplikácii značených erytrocytov sa odporúča dostatočná hydratácia pacienta a časté močenie s cieľom znížiť absorbovanú dávku zvýšením eliminácie rádionuklidu z organizmu.

Po aplikácii má byť pacient vyzvaný k častému príjmu tekutín. Počas 4 – 6 hodín po aplikácii je vhodné močiť čo najčastejšie, aby bola minimalizovaná dávka pre močový mechúr.

Manipulovať s rádiofarmakami môžu len kvalifikované osoby na pracoviskách k tomu určených. Svoju činnosť musia vykonávať tak, aby pri nej nedochádzalo ku akémukoľvek nadbytočnému vystaveniu pacienta alebo personálu radiácii.

Pri skladovaní, príprave a aplikácii rádiofarmák a likvidácii odpadu je nutné dbať na zásady ochrany zdravia pred ionizujúcim žiareniom, vyplývajúce z príslušných predpisov a vyhlášok, ako aj dbať na pokyny miestnych orgánov hygienickej služby. Príprava rádiofarmák musí byť v súlade s príslušnými predpismi pre ochranu zdravia pred ionizujúcim žiareniom a musí vyhovovať požiadavkám Správnej výrobnej praxe pre liečivá.

Rádiofarmaká nemajú byť aplikované det'om mladším ako 18 rokov, pokiaľ predpokladaný prínos vyšetrenia neprevýši možné riziko.

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe.

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Ak je potrebné podať rádiofarmakum žene vo fertilnom veku, vždy je nutné presvedčiť sa o tom, či nie je tehotná. Každá žena, ktorej vynechala menštrúácia, sa má považovať za tehotnú, pokiaľ sa neprekáže opak. Dovtedy sa majú používať len metódy bez využitia zdrojov ionizujúceho žiarenia.

Podanie rádiofarmaka tehotnej žene by spôsobilo tiež radiačné zaťaženie plodu. Preto sa nevyhnutné vyšetrenia robia len v prípade, ak predpokladaný prínos vyšetrení preváži možné riziko pre matku a plod.

Pred aplikáciou dojčiacim ženám je nutné zvážiť, či je možné vyšetrenie odložiť, kým nebude dojčenie ukončené a či je vzhľadom k možnému prieniku rádiofarmaka do materského mlieka jeho podanie vhodné. Ak je aplikácia nevyhnutná, je nutné na dobu 24 hodín dojčenie prerušiť a mlieko, ktoré sa vytvorí, je potrebné odsať a znehodnotiť. Dojčenie je možné obnoviť za predpokladu, že rádioaktivita v mlieku nespôsobí radiačné zaťaženie dieťaťa väčšie ako 1 mSv.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Vplyv nie je známy.

4.8. Nežiaduce účinky.

Vystavenie pacienta účinkom ionizujúceho žiarenia pri rádionuklidových vyšetreniach musí byť opodstatnené na základe ich predpokladaného prínosu. Aplikovaná aktivita musí byť taká, aby pri najmenšej výslednej dávke žiarenia bola dosiahnutá požadovaná kvalita vyšetrenia.

Expozícia ionizujúcemu žiareniu je spojená s možným zvýšením rizika vzniku onkologických ochorení a dedičných chýb. Dlhoročné používanie rádionuklidových diagnostických vyšetrovacích metód nukleárnej medicíny ukazuje, že výskyt týchto nežiaducich účinkov je možné vzhľadom na nízke radiačné dávky očakávať len s malou frekvenciou.

Pri väčšine diagnostických vyšetrení v nukleárnej medicíne je efektívny dávkový ekvivalent (EDE) pre vyšetrovaného menší ako 20 mSv.

Vo veľmi zriedkavých prípadoch boli hlásené po podaní UltraTag RBC nešpecifické prejavy hypersenzitivitu, prevažne typu kožnej vyrážky.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečív, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

4.9. Predávkovanie

Nie je možné.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Diagnostické rádiofarmaká, Hepatálna a retikuloendoltelová sústava, ATC kód: V09DB04

In vitro-značenie erytrocytov technéciom (^{99m}Tc) sa robí pridaním 1,0 - 3,0 ml nezrážanlivej krvi (upravenej heparínom alebo ACD) do reakčnej liekovky. Časť cínatých iónov prechádza difúziou membránou erytrocytov a hromadí sa intracelulárne. Následné pridanie chlórnantu sodného do reakčnej liekovky spôsobí oxidáciu extracelulárne lokalizovaných cínatých iónov. Chlórnan neprechádza membránou erytrocytov, preto je tento proces oxidácie selektívny pre prebytočný extracelulárny cínatý ión. Kyselina citrónová, citrónan sodný a glukózový roztok sa pridávajú k naviazaniu nadbytočných cínatých iónov, k zlepšeniu ich oxidácie chlórnantom a k redukcii nadbytočného množstva chlórnantu. K označeniu erytrocytov v reakčnej liekovke dochádza po pridaní roztoku technecistanu (^{99m}Tc). Technecistan prechádza membránou a je intracelulárne redukovaný prítomnými cínatými iónmi. Redukované technécium už späťne von neprechádza a zostáva vo vnútri erytrocytov. Označenie krviniek je úplne ukončené cca 20 minút po pridaní rádioaktívneho roztoku. Účinnosť značenia pri použití tejto metódy je minimálne 95 %. Po ukončení procesu značenia sú erytrocyty aplikované späť pacientovi a urobí sa scintigrafické zobrazenie.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po i.v. podaní sa červené krvinky rozptýlia v krvnom riečisku s približným distribučným objemom 5,6 % telesnej hmotnosti. Biologický polčas technécia (^{99m}Tc) v krvi je asi 29 hodín. Z

celkového množstva technécia (^{99m}Tc) v krvnom riečisku je 24 hodín po aplikácii 95 % viazané na erytrocyty. Asi 25 % aplikovanej dávky sa počas prvých 24 hodín vylúči močom.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Reakčná liekovka: dihydrát citónanu sodného (natrii citras dihydricus), glukóza bezvodá (glucosum anhydricum), roztok kyseliny hydrochloridovej (acidi hydrochlorici solutio) 1 mol/l, roztok hydroxidu sodného (natrii hydroxidi solutio) 1 mol/l.

Striekačka I: roztok hydroxidu sodného (natrii hydroxidi solutio) 1 mol/l, voda na injekcie (aqua ad inyectabilia).

Striekačka II: dihydrát citónanu sodného (natrii citras dihydricus), glukóza (glucosum), voda na injekcie (aqua ad inyectabilia).

6.2. Inkompatibility

Doteraz nie sú známe.

6.3. Čas použiteľnosti

Čas použiteľnosti: 15 mesiacov pri skladovaní do 25 °C, označené erytrocyty 6 hodín.
Čas použiteľnosti je uvedený na obale.

6.4. Upozornenia na podmienky a spôsob skladovania

Balenie kitu UltraTag^R RBC je nutné skladovať pri teplote do 25 °C.

Striekačka I sa musí chrániť pred svetlom, ak nie je uložená v pôvodnom obale !

6.5. Vlastnosti a zloženie obalu

1 balenie prípravku obsahuje 5 kitov na značenie.

Každý kit sa skladá z troch neaktívnych komponentov:

- 1 reakčná liekovka 10 ml - lyofilizát obsahujúci chlorid cinnatý, citrónan sodný a glukózu, injekčná sklená liekovka uzavorená gumenou zátkou s hliníkovou objímkou a krytom z plastickej hmoty,
- 1 injekčná striekačka I 2,25 ml vopred naplnená roztokom chlórnanu sodného, uzavorená gumeným krytom,
- 1 injekčná striekačka II 2,25 ml vopred naplnená roztokom kyseliny citrónovej a glukózy, uzavorená gumeným krytom.

Uvedené komponenty sú balené v jednej plastikovej škatuľke spolu s 2 kusmi plastikových injekčných piestov, 2 kusmi jednorazových hypodermických injekčných ihiel a štítkov k označeniu lieku.

6.6. Upozornenia na spôsob zaobchádzania s liekom

Návod k značeniu

1. Odoberte 1 - 3 ml nezrážanlivej krvi (upravenej použitím heparínu alebo ACD). **AKO ANTIKOAGULANS NEPOUŽÍVAJTE EDTA ANI OXALÁT !**
2. Širokou ihlou (19-21 G) pridajte 1 - 3 ml nezrážanlivej krvi do reakčnej liekovky a opatrne premiešajte, aby sa obsah liekovky rozpustil. Nechajte reagovať 5 minút.
3. Pridajte obsah **striekačky I**, opatrne premiešajte preklopením 4 - 5 krát.
4. Pridajte obsah **striekačky II**, opatrne premiešajte preklopením 4 - 5 krát.

5. Reakčnú liekovku vložte do oloveného tienenia s krytom (s minimálnou hrúbkou 3-4 mm). Pridajte 370 - 3700 MBq eluátu technecistanu (^{99m}Tc) sodného v maximálnom objeme 3 ml.
6. Opatrne premiešajte obsah liekovky preklopením 4 - 5 krát. Nechajte reagovať po dobu 20 minút za občasného premiešania.
7. Označené erytrocyty sa odporúča aplikovať do 30 minút.
8. Pred aplikáciou je možné urobiť kontrolu účinnosti značenia (pozri bod 6.6.2.). Typická účinnosť značenia je väčšia ako 95 %.
9. Pred odobratím potrebného množstva (určeného k podaniu pacientovi) do injekčnej striekačky, je nevyhnutné obsah reakčnej liekovky premiešať.
10. Určite aktivitu obsahu a zaznamenajte na sprievodné dokumenty a na štítky označujúce obsah.

Kontrola kvality značenia

Kontrolu účinnosti značenia je možné vykonať nasledujúcim spôsobom:

Pridajte 0,2 ml označených erytrocytov do centrifugačnej skúmavky s 2 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného. Centrifugujte 5 minút a potom opatrne odpipetujte oddelenú plazmu.

Zmerajte aktivitu v plazme a v oddelených erytrocytoch. Výpočet urobte podľa vzorca:

$$\% \text{ účinnosti značenia} = \frac{\text{aktivita erytrocytov}}{\text{aktivita erytrocytov} + \text{aktivita plazmy}} \times 100$$

Fyzikálne charakteristiky technécia (^{99m}Tc) sú uvedené v pokynoch pre používanie $^{99}\text{Mo}/^{99m}\text{Tc}$ - generátorov.

Špeciálne upozornenia

Kit neobsahuje antikoagulačnú prísadu, preto použite heparín alebo ACD. Nedostatočne antikoagulačne upravená krv nie je použiteľná k spätej aplikácii pacientovi!

Na tienenie reakčnej liekovky použite olovený kontajner s minimálnou hrúbkou steny 3-4 mm vrátane krytu. Pri aplikácii pacientovi použite tienenu injekčnú striekačku a injekčnú ihlu s väčším vnútorným priemerom ako prevenciu pred hemolýzou.

Dozimetrické údaje

V tabuľke sú uvedené absorbované dávky pre dospelého (70 kg) po i.v. injekcii maximálnej dávky 740 MBq technéciom (^{99m}Tc) značených erytrocytov (podľa ICRP 53, Vol 18, č.1-4, 1987: "Radiation dose to patients from radiopharmaceuticals"):

Absorbovaná dávka (mGy/MBq):

orgán	dospelý	15 rokov	10 rokov	5 rokov	1 rok
Nadobličky	8,7E-03	1,1E-02	1,7E-02	2,7E-02	4,9E-02
Stena moč. mechúra	9,2E-03	1,2E-02	1,7E-02	2,5E-02	4,6E-02
Povrch kostí	9,2E-03	1,3E-02	2,3E-02	3,9E-02	7,8E-02
Prsné žľazy	4,3E-03	4,5E-03	7,2E-03	1,1E-02	1,9E-02
GIT:					
stena žalúdku	4,8E-03	6,1E-03	9,5E-03	1,4E-02	2,4E-02
tenké črevo	4,4E-03	5,3E-03	8,1E-03	1,2E-02	2,2E-02
hrubé črevo					
horná časť	4,3E-03	5,5E-03	7,9E-03	1,3E-02	2,1E-02
dolná časť	3,9E-03	5,3E-03	8,0E-03	1,1E-02	2,1E-02
Srdce	2,3E-02	2,8E-02	4,1E-02	6,2E-02	1,1E-01
Obličky	1,0E-02	1,2E-02	1,9E-02	3,0E-02	5,5E-02
Pečeň	7,5E-03	8,8E-03	1,4E-02	2,1E-02	3,8E-02
Pľúca	1,4E-02	1,8E-02	2,9E-02	4,5E-02	8,5E-02
Vaječníky	4,2E-03	5,4E-03	7,9E-03	1,2E-02	2,1E-02
Pankreas	6,2E-03	7,5E-03	1,1E-02	1,7E-02	2,9E-02
Červená kostná dreň	7,3E-03	8,8E-03	1,3E-02	2,0E-02	3,5E-02
Slezina	1,5E-02	1,8E-02	2,8E-02	4,4E-02	8,4E-02

Semenníky	2,7E-03	3,7E-03	5,4E-03	8,3E-03	1,5E-02
Štítna žľaza	4,9E-03	7,1E-03	1,2E-02	1,9E-02	3,5E-02
Maternica	4,7E-03	5,7E-03	8,5E-03	1,3E-02	2,2E-02
Ostatné tkanivá	3,7E-03	4,4E-03	6,4E-03	9,8E-03	1,8E-02
Efektívny dávkový ekvivalent (mSv/MBq)	8,5E-03	1,1E-02	1,6E-02	2,5E-02	4,6E-02

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Curium Netherlands B.V.
Westerduinweg 3
1755 LE Petten
Holandsko

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

88/0516/96-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDLÍŽENIA REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 17. decembra 1996

Dátum posledného predĺženia registrácie: 06. decembra 2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

02/2023